

青山醫院精神健康教育 《病人資訊》

〈原文由英國皇家精神科學院撰寫印製，香港青山醫院獲該院特許進行中文翻譯〉

安定劑及安眠藥需知

顧名思義，安定劑是幫助用者平靜下來的藥物。要協助他人平靜下來的原因有很多，而各種安定劑的性質也不盡相同。現時，醫生主要利用安定劑來治療焦慮症及驚恐發作的患者，有時也會利用它作為安眠藥、治療某類羊癇症和紓緩戒酒後引起的撤藥反應。

原作：英國皇家精神科學院

翻譯者：青山醫院精神健康教育委員會會員

出版人：青山醫院精神健康教育委員會

地址：新界屯門青松觀路十五號

電話：2456 7111

傳真：2455 9330



青山醫院1998

©(本刊物任何部分之資料，如未獲版權持有人允許，不得用任何方式
(包括電子、機械、影印或記錄)抄襲、翻印、儲存在任何檢索系統上或傳輸。

焦慮與驚恐

我們不時會感到焦慮，這不單是正常的，有些時候還會對我們有幫助，譬如中等程度的焦慮會提高我們的工作能力。可是，若焦慮變得太嚴重，甚至支配我們，令人無法正常生活時，便會變成問題了。最嚴重的焦慮稱為驚恐，雖然每次發作可能為時甚短，但卻極為難受。強烈的焦慮也可以由其他問題造成，抑鬱症便是其中一個例子。紓緩焦慮不一定要依靠藥物治療，不過當其他方法不能減少焦慮時，患者可能需要服用藥物來控制焦慮。但要注意，使用安定劑來治療焦慮，療程應不多於一個月。

失眠

大部分睡眠問題都可靠改變生活習慣而得到改善，通常不需要服用安定劑，詳情可向你的醫生請教。但部分人士在治療初期，或許需要一些藥物的協助。如果必須服用安定劑，患者應盡量避免每晚使用，亦不應服用藥物超過數星期。因常用的安定劑能令一些長者神志混亂，六十歲以上的失眠人士，可能需要使用其他種類的安定劑。

安定劑包括哪些藥物？

用來治療焦慮及驚恐的安定劑統稱作鎮靜劑，它們能減少緊張，如在晚上服用，亦有安眠的作用。最常用的一類安定劑叫苯二氮草，它們在臨床使用的經驗已超越三十年。其他非苯二氮草類的藥物數目較少，（請參閱附表上常見的類別）它們的效果跟苯二氮非常相近。

安定劑有甚麼藥效？

它們能降低焦慮和幫助鬆弛肌肉。不過，這類藥物也能令人昏昏欲睡，影響用者的判斷力、記憶及集中能力，所以用者應避免在藥物影響下駕駛汽車或操作機器。當藥物生效時飲用含酒精的飲料，會加強上述的藥效。有一點很重要，就是短時間作用的安定劑會在數小時內排出體外；但長時間作用的安定劑卻可能留在血液中達數天之久，服用者會在這段時間內繼續受到它的影響。另外，部分用者會在服藥翌日感到「宿醒」。

我怎樣知道醫生處方的藥物中有沒有包括安定劑？

處方藥物時，醫生可選擇使用它們的商業名稱或標準名稱。商業名稱通常比較簡短易記，但不同國家可能會使用不同的商業名稱，即使在同一個國家，如有多家藥商製造同一種藥物，它們也會擁有多個商業名稱。相反，標準名稱或化學名稱通常較長、較難讀、亦較難以記憶，但在不同的國家，它們都是相同的。你的藥劑師會告訴你所服用的藥物是否屬於安定劑。你也可自己嘗試識別，看看藥物的標籤，如果是用標準名稱而結尾是 -azepam的話，它便是苯二氮草類的安定劑了。本單張末段有一些常用安定劑的資料可供參考。

使用安定劑會上癮嗎？

雖然安定劑能迅速減少焦慮，它亦會令部分用者產生依賴，服用者因難以抵受撤藥反應，而不能停止服藥。當然，如用者只服藥數星期或只是偶然服藥，安定劑是不會令人上癮的。可惜的是，過去這類藥物曾被過度使用，有些人甚至已服藥多年，若他們停止服藥，便需要面對很大的困難了。

我怎樣才知道自己是否依賴安定劑？

如有下列情況出現，便應懷疑是否已對安定劑產生依賴：

- (一) 你發覺無論是服用處理焦慮或睡眠的藥物，原來的劑量功效大不如前，要增加劑量才能保持效果。
- (二) 如突然停藥會出現緊張、驚恐或其他較少碰到的不適如強烈痕癢、對光線及聲音非常敏感、手腳感到輕微的刺痛等。

如我必須服用安定劑，我可以怎樣避免對它產生依賴？

所有安定劑在開始服用時都是十分有效的，如你能防止自己的身體適應了安定劑的作用，它們將會繼續生效。怎樣才可做到呢？最佳方法莫如有需要才使用安定劑及不要長時間定期服食。如藥物標籤上註明「有需要時服用」，你便應在最緊張及焦慮時才使用安定劑。若你能隔天或以上才服用藥物一次，無論使用多久都不會產生依賴；相反，若你每天都服用藥物，尤其一天使用數粒藥物，產生依賴的機會便會大增了。

常用安定劑苯二氮草類

<u>標準名稱</u>	<u>商業名稱</u>	<u>作用長短</u>
Diazepam 安定	Valium, Atensine, Tensium	長時間
Nitrazepam 硝基安定	Mogadon, Nitrados	長時間
Chlordiazepoxide 利眠寧	Librium	長時間
Lorazepam 氯羟安定	Ativan	短時間
Loprazolam	Dormonoc	中時間
Oxazepam 甲羟安定, 舒寧	Serexid	短時間
Temazepam 3-羟安定, 甲羟舒寧	Temazepam	短時間
Lormetazepam		短時間

常用安定劑—非苯二氮草類

<u>標準名稱</u>	<u>商業名稱</u>	<u>作用長短</u>
Chloral Hydrate	Noctec , Welldorm	長時間
Chlormethiazole 氯美噻唑	Heminevrin	長時間
Buspirone Hydrochloride 丁螺環酮	Buspar	短時間
Zopiclone 佐匹克隆	Zimovane 《譯者按：又稱 Imovane》	短時間
Meprobamate 甲丙氯酯	Equanil	長時間