



醫院管理局·新界西醫院聯網  
急症部  
病人手術資料單張

## 甲下血腫引流法

Version No. 2009/10

Name of Patient :

HKID No.

Sex : Male / Female Age :

Date of Birth :

HN :

### 簡介

甲床位於指甲與指骨之間(圖一)。甲下血腫一般因手指或腳趾末梢受到鈍性創傷而引至，其形成是由於血塊積聚於指甲與甲床之間(圖二)。甲下血腫帶來的痛楚，除了直接因受傷的組織導致，亦因血腫做成的壓力而增加。引流血腫對減低痛楚，有着顯著的療效。


### 適用病症

新創傷的甲下血腫，而指甲未受損傷  
(少量的血腫或可不需引流)

### 禁忌症

1. 指甲斷裂\*
2. 指甲撕脫\*
3. 人造指甲

\*如有需要，醫生或會考慮除去指甲以作甲床修補




圖一

### 手術效益

1. 減輕痛楚
2. 改善外觀上的效果

### 手術過程

1. 一般而言，因指甲並無痛楚感覺，此手術並不需要在麻醉下進行
2. 清洗受傷部位，把手指或腳趾上的污物及碎片洗掉
3. 環鑽術：利用以下其中一種器材在指甲上加上一或兩個小孔
  - 以電池運作之烙器(圖三)；或
  - 加熱的迴紋針
4. 用手指加壓，幫助引流，以徹底清除甲下血腫
5. 如小孔閉塞，會再環鑽附加的小孔
6. 包紮傷口




圖二

### 手術後注意事項

1. 抗生素的使用與否，為臨床的決定
2. 遵從指示服用止痛劑 及/或 抗生素
3. 根據醫生指示，接種破傷風的疫苗
4. 把受傷部位抬高，以減少傷口腫脹及出血
5. 保持傷口清潔，並留意引流情況
6. 如甲下血腫再次積聚，可嘗試把指甲浸泡於暖水之中，然後加壓以擠出血腫
7. 如懷疑傷口出現問題，應盡早向醫生求助，包括以下情況：
  - 發燒
  - 痛楚增加
  - 指甲流出化膿性或帶臭氣的液體
  - 手指 / 腳趾出現紅斑

\*請注意，術後傷口輕微滲血一至兩天乃屬正常情況



圖三

### 後遺症

1. 失去指甲
2. 指甲變形
3. 感染

### 備註：

後遺症的出現與否，與創傷程度有很大關係。在同意進行手術前，病人必需清楚，並接受無論手術如何完善，以上之後遺症仍然可以發生。由於沒有可能把所有風險或後遺症列出，以上只列出最常見及重要的風險。