




醫院管理局  
新界東醫院聯網

Hospital Authority  
New Territories East Cluster



# 中風病人接受的檢查

# 診斷：臨床檢驗

## 檢查包括:

- 身體的活動、感覺、言語及視野。
- 臨床檢驗 - 血壓，體溫。
- 血液檢驗 - 血色素、血小板、血凝時間、血糖、及膽固醇。
- →可幫助醫生得知病人有沒有貧血、出血傾向，糖尿病或血脂過高等現象。
- 心電圖
- →可監察心跳活動，排除心肌梗塞及心律不齊等情況。

# 特別檢查: 電腦掃描

電腦掃描是在腦部的不同深度拍照 x-光片，以比較腦組織的密度，密度減少，x-光片會呈現得較為深暗，大多見於缺血性中風的病人。

出血性中風後，血塊在x-光片會呈現白色。這樣就可分辨缺血性或出血性中風



血塊形成

# 特別檢查: 核磁共振血管造影


核磁共振檢查簡稱MRI, 是沒有幅射的影像技術之一。

過程需要注射特製的顯影劑到體內。並在強大的磁場作用下, 塑造出顱內血管的造影。

要注意, 如身上有金屬物件, 可引起不良反應。所以, 身上安裝有金屬支架、儀器等; 例如起搏器要事先通知職員, 以策安全。



進行檢查時候, 病人需要保持不動




磁力共振血管造影

# 特別檢查：腦血管超聲波掃描

腦血管超聲波掃描是用超聲波來檢測腦內的血流速度。

檢查是無創傷性，十分安全。

憑此可評估血管狀況，診斷出血管是否狹窄。




# 特別檢查: 頸血管超聲波檢查

頸血管超聲波檢查是一項超聲波檢查。

焦點在頸部血管, 尤其是頸動脈。

同樣, 除探測血液流動的速度外, 亦可診斷出血管是否狹窄。



# 參考文獻

- 高山, 黃家星 (2004), 經顱多普勒超聲(TCD)的診斷技術與臨床應用, 中國協和醫科大學出版社
- Rother J, et al. Middle Cerebral artery stenoses: assessment by magnetic resonance angiography and transcranial Doppler ultrasound. *Cerebrovascular Dis*, 1994, 4:273-279

# 鳴謝：

- 威爾斯親王醫院內科及藥物治療學系
- 岑緯政，專科護士，威爾斯親王醫院內科及藥物治療學系
- 李嘉汶，註冊護士，威爾斯親王醫院內科及藥物治療學系
- 林鍵，註冊護士，威爾斯親王醫院內科及藥物治療學系
- 鍾翠蘭，新界東醫院聯網護理服務總監
- 唐婉芬，專科護士，威爾斯親王醫院
- 李月娥，資深護師，沙田醫院感染控制
- 香港中文大學那打素護理學院 以實証為據香港區中心  
湯迪偉教授、周柏珍副教授
- 新界東醫院聯網護理資訊工作小組
- 香港中文大學醫學院資訊科技部門

# 責任聲明

- 本單張及影片所提供的健康資訊僅供教育及參考用途。應用任何資訊前請先向你的醫護專業人員查詢有關資料對閣下是否適用。
- 若閣下因採納建議的程序，而招致損失、代價、花費、或法律責任，本院可得到法律的批准而豁免。