


Cervical Cancer in 2020


2020年子宮頸癌統計數字

	Incidence 發病	Mortality 死亡
Number of cases registered 登記個案數目	556	159
Rank 排名	7	8
Proportion of all cancers 佔總數百分比	3.2%	2.6%
Median age (years) 年齡中位數 (歲)	55	63
Crude rate 粗率	13.7	3.9
Age-standardised rate [ASR] ¹ 年齡標準化比率 ¹	7.6	1.9
Average Annual Percent Change of ASR over the past 10 years ² 年齡標準化比率在過去十年內的平均每年百分比變化 ²	+1.2%*	-0.4%
Lifetime risk before age 75 一生累積風險 (0-74歲)	1 in 131	1 in 496
Five-year relative survival ³ 五年相對存活率 ³ (2010-2018)	65.8%	


Age-specific Incidence and Mortality Rates for Cervical Cancer in 2020
2020年按年齡組別分佈的子宮頸癌發病及死亡率




Incidence and Mortality Trends for Cervical Cancer, 2006-2020
2006-2020年子宮頸癌發病及死亡率趨勢



Stage Distribution of Cervical Cancer in 2020
2020年子宮頸癌期數分佈



Survival by Stage at Diagnosis: Cervical Cancer in 2010-2017
按期數分佈存活率：2010-2017年子宮頸癌患者



¹ Age-standardised rates (ASR) are age-adjusted to the World Standard Population of Segi (1960) and expressed per 100,000 female population. Comparisons with these rates from other sources are valid only under the same standard population for calculations.

年齡標準化比率是根據 Segi (1960) 世界標準人口並以每十萬女性人口計算。用於進行比較不同族群之間的疾病率時，需以同一標準人口為基準計算才有意義。

² Average Annual Percent Change of ASR is a summary measure of the trend over a specified interval (* represents statistically significant at the 0.05 level). For details, please refer to the glossary in HKCaR website (www3.ha.org.hk/cancereg/glossary.html#aapc).

ASR 的平均每年百分比變化是基於特定年期的數據進行計算來總結過往趨勢的測量工具(* 號代表於0.05水平上達至統計顯著)。有關詳情請參閱 HKCaR 網站內的詞彙表 (www3.ha.org.hk/cancereg/tc/glossary.html#aapc)。

³ Relative survival (RS) is the proportion of cancer patients surviving for a specified time after diagnosis of cancer, compared to people without cancer in general population. RS is the most commonly used method to measure survival of people with cancer in a population.

相對存活率是指與相同性別和年齡的一般人口比較後的存活百分比。這是計算以人口為基礎的癌症患者存活率中最常用的方法。