

Sleepwalking

編輯:青山醫院精神健康學院

出版人 :青山醫院精神健康學院

地址 : 新界屯門青松觀路十五號

電話 : 2456 7111

傳真 : 2455 9330

網址 : http://www.imh.org.hk

青山醫院 2012(第四版)

◎本刊物任何部分之資料,如未獲版權持有人允許,不得用任何方式(包括電子、機械、影印或記録)抄襲,翻印,儲存在任何檢索系統上或傳輸。

本刊物之印刷費用全賴各界熱心人士捐款贊助。請您捐款支持青山醫院的精神健康教育推廣, 捐款途徑請瀏覽 http://www.imh.org.hk







何謂夢遊

- 一個人在夢遊的時候,其視覺、聽覺、觸覺等感官仍 保留相當的接收能力,在其熟悉的環境裏大概可以行 動自如,也可做出各種動作
- 夢遊患者可以在睡眠中起床、四處走動、穿衣服、上廁所等
- 患者於夢遊時雙目瞪視,面無表情。他不會回應別人的説話 而別人也很難喚醒他,但他可能會服從別人的命令而躺回床 上去
- 夢遊通常於主要睡眠時段的前三分之一中發生,也是在非快速眼動期間發生(Non-Rapid Eye Movement Stage)
- 每次夢遊發作通常維持數秒至數分鐘。在罕有的情況下,也可維持長達一小時
- 醒來後,患者完全記不起他夢遊時所作的一切

1. 發病率

發病率在百分之一至十五左右,最常見於四至十二歲的兒童身上。兒童的夢遊大部分在成年後消失



2. 成因

- 遺傳因素
 - 一 大約有一半的夢遊患者可在其親屬中 找到患有夢遊的人



- 藥物影響
- 其他
 - 一 壓力、缺乏睡眠、酒精都可以誘發夢遊



3. 診斷

- 臨床診斷
- 多項睡眠電圖檢討 (Polysomnography)

4. 治療

- 要避免患者在夢遊時發生意外,患者及家人應做好安全措施, 例如:鎖好門窗,將利刀、剪刀等鋒利物件收藏好
- 要有充足的睡眠
- 避免喝酒
- 適當地處理壓力

