

藥物的認識

(7) 抗膽鹼能藥

抗 膽 鹼 能 藥

引言

此小冊子旨在簡介精神科藥物，當中只包括醫院管理局內使用的每一類精神科藥物中最常用的藥物。因此其用途、副作用和種類未必能夠一一盡錄。另外，服用藥物後的反應因人而異，如有任何疑問，讀者應該向醫生和藥劑師查詢。

7) 抗膽鹼能藥(俗稱解藥)


Artane (Benzhexol)

用途：

減低由服用抗精神病藥物引起的副作用，如手震、肌肉僵硬及行動緩慢等帕金森綜合症徵狀。注射劑 Cogentin (Bentropine) 亦有相同效用。

副作用：

口乾、瞳孔放大及怕光、皮膚敏感、便秘、嘔吐、頭暈、神智不清、精神緊張等。



編輯：青山醫院精神健康學院
出版：青山醫院精神健康學院
地址：新界屯門青松觀路 15 號
電話：2456 7111
傳真：2455 9330
網址：www.imh.org.hk

青山醫院 (第四版)

©本刊物任何部分之資料，未獲版權持有人允許，不得用任何方式 (包括電子、機械、影印或記錄) 抄襲、翻印、儲存在任何檢索系統上或傳輸。

本刊物之印刷費用全賴各界熱心人士捐款贊助。請您捐款支持青山醫院的精神健康教育推廣，捐款途徑請瀏覽 www.imh.org.hk。

查閱此教育資料之最新版本及簡中版本，請瀏覽青山醫院精神健康學院網頁 www.imh.org.hk。