

藥物的認識

(3) 情緒穩定劑

情 緒 穩 定 劑

引言

此小冊子旨在簡介精神科藥物，當中只包括醫院管理局內使用的每一類精神科藥物中最常用的藥物。因此其用途、副作用和種類未必能夠一一盡錄。另外，服用藥物後的反應因人而異，如有任何疑問，讀者應該向醫生和藥劑師查詢。

3) 情緒穩定劑

用途:

可幫助穩定情緒，減少情緒過分波動。可用於治療狂躁症及防止情感性精神病的復發。某些抗腦癇藥也有以上的作用。

1. Lithium (鋰)

服用此藥者，需定期抽血檢驗，以確保鋰劑在血液裏的分量恰當，因為分量太少則效用不大，太多卻會引致危險的副作用。女性要適當避孕，如打算懷孕，須與醫生商量。

用途：

幫助穩定情緒，用於治療狂躁症及防止情感性精神病的復發，也可幫助治療久未痊癒的情緒低落。

副作用：

暫時性的輕微肚瀉、作嘔、手震、口渴及尿頻，也會影響甲狀腺功能或導致胎兒不正常。若中鋰毒，會出現視力模糊、腸胃

不適、手震厲害、昏迷及抽搐等徵狀，如出現以上副作用，請盡快與你的醫護人員聯絡。

2. Carbamazepine (Tegretol)

用途：

幫助穩定情緒，用於治療狂躁症及防止情感性精神病的復發，也可控制腦癇症。

副作用：

頭暈、嗜睡、口乾、腸胃不適、皮膚過敏反應等。


3. Sodium Valproate (Epilim)

用途：

幫助穩定情緒，用於治療狂躁症，也可控制腦癇症。

副作用：

頭暈、嗜睡、腸胃不適、過敏反應等，亦有可能影響肝功能。



編輯：青山醫院精神健康學院
出版：青山醫院精神健康學院
地址：新界屯門青松觀路 15 號
電話：2456 7111
傳真：2455 9330
網址：www.imh.org.hk

青山醫院 (第五版)

©本刊物任何部分之資料，未獲版權持有人允許，不得用任何方式 (包括電子、機械、影印或記錄) 抄襲、翻印、儲存在任何檢索系統上或傳輸。

本刊物之印刷費用全賴各界熱心人士捐款贊助。請您捐款支持青山醫院的精神健康教育推廣，捐款途徑請瀏覽 www.imh.org.hk。

查閱此教育資料之最新版本及簡中版本，請瀏覽青山醫院精神健康學院網頁 www.imh.org.hk。