

藥物的認識

(8) 抗認知障礙症藥

抗 認 知 障 礙 症 藥



醫院管理局
HOSPITAL
AUTHORITY



青·山·醫·院
Castle Peak Hospital



青山醫院精神健康學院
Institute of Mental Health
Castle Peak Hospital

引言

此小冊子旨在簡介精神科藥物，當中只包括醫院管理局內使用的每一類精神科藥物中最常用的藥物。因此其用途、副作用和種類未必能夠一一盡錄。另外，服用藥物後的反應因人而異，如有任何疑問，讀者應該向醫生和藥劑師查詢。

8) 抗認知障礙症藥

這些藥物有增加認知障礙症 (舊稱老人痴呆症) 病人腦內影響記憶之化學物質的作用，故可減慢患者記憶力衰退的速度。

1. Donepezil (Aricept)

用途：

主要用於減慢輕至中度認知障礙症患者記憶力衰退的速度。另外，此藥對患者其他的心智功能，例如：表達能力下降，判斷力減退等也有一定幫助。

副作用：

身體乏力、肌肉痙攣、噁心、嘔吐、腹瀉、頭暈、頭痛等。

2. Rivastigmine (Exelon)

用途：

可幫助輕至中度認知障礙症患者減慢記憶力及其他心智功能衰退的速度，從而提升患者的自我照顧能力。其藥貼 (Exelon Patch) 則能提供 24 小時的藥效，亦可減少口服藥物劑量提升時可能帶來的腸胃不適問題。

副作用：

噁心、嘔吐、腹瀉、胃痛、食慾不振、頭暈、頭痛等。

3. Memantine (Ebixa)

用途：

可幫助減慢認知障礙症患者於心智功能衰退的速度，從而提升患者的自我照顧能力。

副作用：

頭暈、頭痛、血壓上升等。



編輯：青山醫院精神健康學院
出版：青山醫院精神健康學院
地址：新界屯門青松觀路 15 號
電話：2456 7111
傳真：2455 9330
網址：www.imh.org.hk

青山醫院 (第四版)

©本刊物任何部分之資料，未獲版權持有人允許，不得用任何方式（包括電子、機械、影印或記錄）抄襲、翻印、儲存在任何檢索系統上或傳輸。

本刊物之印刷費用全賴各界熱心人士捐款贊助。請您捐款支持青山醫院的精神健康教育推廣，捐款途徑請瀏覽 www.imh.org.hk。

查閱此教育資料之最新版本及簡中版本，請瀏覽青山醫院精神健康學院網頁 www.imh.org.hk。