

藥物的認識

(6) 抗腦癇藥

抗 腦 癇 藥

引言

此小冊子旨在簡介精神科藥物，當中只包括醫院管理局內使用的每一類精神科藥物中最常用的藥物。因此其用途、副作用和種類未必能夠一一盡錄。另外，服用藥物後的反應因人而異，如有任何疑問，讀者應該向醫生和藥劑師查詢。

6) 抗腦癇藥

1. Carbamazepine (Tegretol)

用途：

可控制腦癇症，亦有助穩定情緒。

副作用：

頭暈、嗜睡、口乾、腸胃不適、皮膚過敏反應等。

2. Sodium Valproate (Epilim)

用途：

可控制腦癇症，亦有助穩定情緒。

副作用：

頭暈、嗜睡、腸胃不適、過敏反應等，亦有可能影響肝功能。

3. Phenytoin (Dilantin)

用途：

可控制腦癇症，亦可改善酒精戒斷徵狀。

副作用：

頭暈、手震、齒齦增生肥大、噁心、倦怠等。

4. Lamotrigine (Lamictal)

用途：

可控制腦癇症，亦有助穩定情緒。

副作用：

皮膚疹、視力模糊、頭暈、嗜睡、易怒等。


5. Clonazepam (Rivotril)

用途：

可控制腦癇症，亦有助穩定情緒。

副作用：

倦怠、嗜睡、頭暈、易怒等。



編輯：青山醫院精神健康學院
出版：青山醫院精神健康學院
地址：新界屯門青松觀路 15 號
電話：2456 7111
傳真：2455 9330
網址：www.imh.org.hk

青山醫院 (第五版)

©本刊物任何部分之資料，未獲版權持有人允許，不得用任何方式（包括電子、機械、影印或記錄）抄襲、翻印、儲存在任何檢索系統上或傳輸。

本刊物之印刷費用全賴各界熱心人士捐款贊助。請您捐款支持青山醫院的精神健康教育推廣，捐款途徑請瀏覽 www.imh.org.hk。

查閱此教育資料之最新版本及簡中版本，請瀏覽青山醫院精神健康學院網頁 www.imh.org.hk。