

व्यक्तिगत तौर पर परामर्श में भाग लेने वाले COVID-19 मरीज के लिए नोट करने हेतु बिंदु



COVID-19 मरीजों के लिए अस्पताल प्राधिकरण (HA) की परामर्श सेवा

- COVID-19 के हल्के लक्षण वाले मरीज परामर्श की सेवाएँ प्राप्त कर सकते हैं, और उनको दुर्घटना और आपातकालीन विभाग (A&E) में हाज़िर होने की जरूरत **नहीं** है
- यदि मरीज पहले ही इलाज करवा चुके हैं, तो कृपया HA में अपॉइंटमेंट कैंसिल कर दें, ताकि अन्य जरुरतमंद मरीजों को कोटा जारी किया जा सके





डॉक्टर की सलाह और दवाई का पर्चा

• नोट करने योग्य बिंदुः




प्राइवेट क्लीनिकों में फॉलो-अप किये जा रहे पुरानी बीमारियों के मरीजों के लिए, डॉक्टरों के संदर्भ के लिए निर्धारित दवाईयां और पैकेजिंग दिखाएँ

• COVID-19 ओरल दवाईयों के दुष्प्रभाव सामान्य नहीं हैं और आम तौर पर हल्के होते हैं। यदि गंभीर दुष्प्रभाव होते हैं, तो कृपया दवा लेना बंद कर दें और जल्द से जल्द डॉक्टरी सलाह लें



स्वास्थ्य सुझाव

• नोट करने योग्य बिंदुः





स्वास्थ्य की स्थिति की निगरानी करें, जैसे कि शरीर का तापमान मापना और पल्स ऑक्सीमीटर का प्रतिदिन दो बार उपयोग करना

यिद चेतावनी के लक्षण (जैसे लगातार बुखार या साँस लेने में कठिनाई होना) होते हैं, तो कृपया जल्द से जल्द A&E पर जाएँ



Points to note for COVID-19 patient on attending in-person consultation



Hospital Authority (HA) consultation service for COVID-19 patients


- COVID-19 patients with mild symptoms may receive consultation services, and need
 NOT attend the Accident & Emergency (A&E) Department
- If patients have already received treatment, please cancel the appointment at the HA, so as to release quota to other patients in need





Doctor consultation and medication prescription

Points to note:



For chronic disease patients being followed up at private clinics, show the prescribed medications and packaging for doctors' reference

• Side effects of COVID-19 oral drugs are not common and are generally mild. If severe side effects occur, please stop taking the medication and seek medical

consultation as soon as possible





Health tips

Points to note:





- Monitor health condition, such as measuring body temperature and using pulse oximeter twice daily
- If warning symptoms (e.g. persistent fever or onset of difficulty breathing) occur, please go to A&E as soon as possible