

Drugs for Hypnotic نیند کیلے ادویات

ہپنائٹکس کیا ہیں؟

ہپنائٹکس ادویات کا ایسا گروپ ہے جو نیند لانے میں مدد دینے کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ اکثر اوقات انہیں نیند کے مختلف عارضہ جات خصوصاً بے خوابی کے علاج کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ ان ادویات کے کام کرنے کا طریقہ کاریہ ہے کہ یہ نیند لانے، ایسے برقرار رکھنے یا اس کے معیار کو بہتر بنانے میں معاونت کرتی ہیں۔ ان کے کام کرنے کا طریقہ کار مختلف ہوتا ہے جس کا انحصار اس بات پر ہوتا ہے کہ کس قسم کی ہپنائٹک دوا استعمال کی جا رہی ہے۔

ہپنائٹک ادویات کی تین عام اقسام ہیں:

1. اینٹی ہسٹامائنز: اینٹی ہسٹامائنز عام طور پر اینٹی الرجی ادویات کے طور پر جانی جاتی ہیں، اور انہیں الرجی کی علامات جیسا کہ بھقی ناک اور جلد کی خارش کو ختم کرنے کے لیے تجویز کیا جاتا ہے۔

اینٹی ہسٹامائنز دماغ کے ایک کیمیل ہسٹامائنز جو بلاک کر کے غنودگی پیدا کرتی ہیں، کیوں کہ ہسٹامائنز بیداری کو فروغ دیتا ہے۔

2. زی۔ ڈرگز: زی۔ ڈرگز نیند لانے والی ادویات کی ایک نئی قسم ہے۔ یہ آپ کو رات کو جلدی نیند لانے اور رات کے وقت جاگنے کو روکنے میں مدد دیتی ہیں۔ زی۔ ڈرگز عام طور پر بے خوابی کے مختصر مدتی علاج کے لیے استعمال کی جاتی ہیں۔

3. بیانزوڈایازپائنز: بیانزوڈایازپائنز GABA کے اثر کو بڑھا کر دماغ کی سرگرمی کو سست کرتے ہیں اور اس طرح سکون بخش اثر پیدا کرتے ہیں۔ یہ ادویات اضطراب اور نیند کی خرابی سمیت مختلف عارضہ جات میں استعمال ہوتی ہیں۔ تاہم اُن پڑنے (عادی ہو جانے) کے خطرہ کی وجہ سے ان کا طویل عرصہ کے لیے استعمال تجویز نہیں کیا جاتا۔

مضار اثرات کیا ہیں؟

ہپینائٹکس کے مضار اثرات مختلف پوسکتے ہیں جس کا انحصار ان کی قسم پر ہوتا ہے:

ہپینائٹکس	عام مضار اثرات	تبصرہ
اینٹی ہستامائنز کلورفینیرامائنز، ہائیڈراکسی زین، پرومیتهازین،	منہ خشک ہو جانا، قبض، دھنڈلا نظر آنا، غنودگی طاری ہونا، سردرد	اینٹی ہستامائنز کو اپنا اثر دکھانے میں 20 منٹ تا ایک گھنٹہ لگتا ہے۔
زی-ڈرگز زوپیکلون، زولپیدم	متلی، بدہیضمی، چکر آنا، سردرد، منہ کا خشک ہونا، اگلے دن نیند کا غلبہ ہونا، منہ سے دھات جیسا ذائقہ آنا	زی-ڈرگز اثر دکھانے میں عام طور پر تقریباً ایک گھنٹہ لیتی ہیں۔ کچھ لوگوں میں نیند کے دوران چلنے کا مسئلہ پیش آسکتا ہے اور اس کے امکانات میں اس وقت اور زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے جب آپ زی-ڈرگز کو الکوحل یا دماغی صحت کے مسائل کی دیگر ادویات کے ساتھ استعمال کرتے ہیں۔
بینزوڈایازپائئنز الپرازولام، برومانیپام، کلونازیپام، ڈایازیپام، لوریزیپام	سرچکرانا، الجهن یا ذہنی انتشار، لڑکھہڑاہت، چکر آنا، بکلانا، پتھوں کی کمزوری	بینزوڈایازپائئنز میں لَت/عادت ڈالنے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ عادت پڑنے کے امکان کو کم کرنے کے لیے، یہی تجویز کیا جاتا ہے کہ اس کی کم سے کم موثر خوارک لی جائے اور اس کا استعمال مختصر عرصہ کے لیے کیا جائے۔ اگر آپ کو دوا کی زیادہ مقدار لمبے عرصے تک درکار ہو، یا اگر آپ کو پہلے سے شراب یا منشیات کے استعمال کی عادت رہی ہو، تو اس دوا کی عادت پڑ جانے کے امکانات مزید بڑھ جاتے ہیں۔

کیا میں اپنی ہپینائٹکس (نیند آور) ادویات لینا بند کرسکتا/سکتی ہوں؟

ہپینائٹکس (نیند آور) ادویات کا استعمال بند کرنا ہمیشہ کسی ماہر صحت کی نگرانی میں ہونا چاہیئے۔ ان کا استعمال اچانک بند کرنا بھی ان علامات کا باعث بن سکتا ہے جو ان ادویات کا استعمال کرنے کے نتیجے میں سامنے آتی ہیں۔ اگر آپ کو ہپینائٹکس کا استعمال کرتے ہوئے ایک ماہ سے کم عرصہ ہوا ہے تو ان علامات کے ظاہر ہونے کے امکانات کم ہیں۔

مجھے کتنا عرصہ تک ہپنائٹکس ادویات لینا پہوں گی؟

ہپنائٹکس ادویات کے ذریعے علاج کا دورانیہ مختلف ہوتا ہے جس کا انحصار مريض اور اس کے ساتھ ساتھ اُسے درپیش نہیں سے متعلقہ بیماری پر ہوتا ہے۔ بہت سی صورتوں میں، یہ ادویات مختصر مدت (چند بفتوں) کے علاج کے لیے استعمال ہوتی ہیں۔

عادت پڑ جانے کے خطرے کے پیش نظر عام طور پر ان ادویات، خاص طور پر بنزوڈایازپائائز کے طویل دورانیہ کے لیے استعمال سے اجتناب کیا جاتا ہے۔ آپ کا ماہرِ صحت علاج کے دورانیہ کا تعین کرے گا۔

کرنے کے کام

1. ڈاکٹر کی ہدایات پر سختی سے عمل کریں
2. اپنی دوائی لینے سے پہلے اس کے نام، خوراک اور فریکوئنسی (یعنی کس طواتر کے ساتھ لینی ہے)، وغیرہ پر توجہ دیں
3. نسخہ کو احتیاط سے پڑھیں
4. خوراک، استعمال کی وجہ، ممانعت اور مضر اثرات پر توجہ دیں
5. ادویات کے استعمال کا طریقہ سمجھیں
6. اپنی دوا کو مناسب طریقے سے محفوظ کریں
7. مقررہ مدت تک دوا کا استعمال کریں جب کہ اس کے برعکس کوئی ہدایت نہ کر جائے
8. اگر آپ کے کوئی سوالات ہیں، اپنی فیملی سے بات کریں اور اپنے ماہرین صحت سے مشورہ لیں

نہ کرنے کے کام

1. خود سے دوا کی خوراک میں تبدیلی کرنا
2. ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر اپنی دوائی کا استعمال روک دینا
3. اپنی دوائی کے ساتھ الکوحل کا استعمال کرنا
4. اپنی دوائی کو کسی اور بوتل میں ڈالنا
5. اپنے ڈاکٹر کی پدایت کے بغیر کوئی اور دوائی لینا
6. دی گئی ہدایات کی تعمیل کے حوالے سے ڈاکٹر سے جھوٹ بولنا

یہ دستاویز اصل متن کا ترجمہ ہے جو انگریزی میں ہے۔ کسی بھی تضاد یا عدم مطابقت کی صورت میں، انگریزی ورژن کو فوقیت حاصل رہے گا۔