

新一代的 抗精神病藥



葵涌醫院
KWAI CHUNG
HOSPITAL



醫院管理局
HOSPITAL
AUTHORITY

出版：葵涌醫院
地址：新界葵涌醫院路3-15號
電話：2959-8111
傳真：2745-7610
網站：www.ha.org.hk/kch

二零一五年三月初版
版權所有•翻印必究

甚麼是新一代的抗精神病藥？

新一代的抗精神病藥在於較少機會產生手震、肌肉僵硬、行動緩慢、坐立不安和肌肉運動障礙等「錐體外系統」副作用。除氯氮平外，其他的療效，則與傳統藥物沒有明顯分別。

氯氮平是甚麼藥物？

氯氮平主要治療精神分裂症，與傳統的抗精神病藥物比較，除副作用較少之外，對部分患者是有特殊療效。約有百分之三十至六十的此類患者，在服用氯氮平後，病情得以改善，重過較正常的生活。

氯氮平有甚麼副作用？

可能出現的副作用包括顆粒性白血球缺乏症、疲倦、渴睡、唾液增加、心跳加速、便秘、暈眩、體重增加、小便失禁和心肌炎等。

而由於氯氮平有少於百分之一機會引起一種比較嚴重之副作用，名為「顆粒性白血球缺乏症」。為確保得到最佳之保障，服用者須於服用期內之首十八個星期，每星期驗血一次，其後每一個月一次。驗血主要是量度「顆粒性白血球」之數目，確保患者擁有足夠之顆粒性白血球。

其他新一代的抗精神病藥有甚麼副作用？

雖然新一代藥物副作用較少，但仍可能令服用者產生「錐體外系統」和內分泌副作用，而且部分藥物會令服藥者體重增加和患上糖尿病的風險增加；其他副作用包括疲倦、渴睡、暈眩、血壓低、便秘、口乾和心電圖轉變等。新一代藥物應用於妊娠期的患者，必須加倍謹慎。準備懷孕的或在妊娠期的患者，應個別向醫生諮詢有關藥物使用。

臨床應用

新一代的精神病藥或可彌補傳統藥物的缺陷，減輕對患者的副作用。但由於氯氮平的副作用和安全性，它只會被應用於病情頑固的精神分裂症患者。

如服用新一代的抗精神病藥期間，出現副作用的情況，患者毋需擔心，請盡快告知醫生從而作出適當的調節。

服用新一代的抗精神病藥須知

應要	不要
■ 嚴格遵從醫生的指示 ■ 服藥前，清楚藥物的名稱、服用劑量及次數等 ■ 詳細閱讀藥物標籤 ■ 留意藥物之劑量、性質、功效、禁忌和副作用 ■ 清楚使用服用方法 ■ 妥善儲存 ■ 完成整個療程 ■ 如對藥物存疑，與家人商討，並向醫護人員求助	■ 擅自改變服用劑量及次數 ■ 擅自停止服用 ■ 不定時、不定量服用 ■ 與酒精飲品服用 ■ 將藥物放入其他藥瓶內 ■ 在沒有遵從醫生指示下同時服用多種藥物 ■ 向醫生隱瞞服用的情況