



- वार्ड भित्र दगर्न मनाही



- जब तपाईंको बच्चा शरीरको निम्न भागको दुर्बलताले गर्दा अस्थिर हुँदै हिंडछ कृपया साथ दिनुहोस नन्हा सहायताको निमित अनुरोध गर्नुहोस।



- बच्चा एकलै चौकीमा बसेको समयमा कहिले पनि एकलो छोडेर नजानुहोस।



वार्डको आँकडा अनुसार, ऊचाईबाट लडेको घटनामा ९५% बच्चा लडेको कारण सुताउने कोक्रोका (क्रिब) बार रेखदेख गर्ने मानिसको अनुपस्थिति मा, उच्चतम अवस्था सम्म उठाएर नराखेकोले गर्दा हो।

तपाईंले एकै क्षणको निमित पनि बच्चालाई एकलो छोडेनु पर्दा बच्चाको सुरक्षाको निमित कोक्रोको बार ठीक प्रकारले माथि सम्म उठाउनु पर्न औचित्य माथि हामी अत्यन्त महत्व दिन्छौं।

अंग्रेजीरनेपालीसंस्करणबीचकूनैपनिविसंगतिभएमा, अंग्रेजीसंस्करणप्राथमिकताहुनेछ।

Should there be any inconsistency between the English and Nepali version, the English version shall prevail.

आभार स्वीकृति:

鳴謝
Acknowledgement

रोगी सशक्तिकरण कार्यक्रम
न्यू टेरिटोरिज वेस्ट क्लस्टर


新界西醫院聯網
New Territories West Cluster
病人啟力基金
Patient Empowerment Programme

Date of Printing : Nov., 2019

शिशुहरुको साधारण वार्ड लड्न वा

पछारिन देखि बचाव गर्ने

Fall Prevention



चुन मुन अस्पताल

शिशु अनि किशोरहरुको औषधि विभाग

Tuen Mun Hospital
Department of Paediatrics & Adolescent Medicine



लड्नबाट जोगाउने उपाय बारे परामर्श


प्रिय निर्देशिका:

बाल्य अवस्था बच्चाको विकाश द्रुतगतिमा हुने समय हो अनि लड्न खतरा घरमा अथवा अस्पतालमा पनि सम्भव हुन्छ।

बच्चा हुर्किंदै अनि विकाशित हौंदै जाँदा लड्न जोखिमको विषयमा मातापिता अनि रेखदेख गर्नेहरुलाई बच्चालाई लड्नबाट कसरी जोगाउन पर्ने हो सो अङ्ग रामो प्रकारले बुझनलाई हामी परामर्श दिई रहेछौं।

बच्चाहरु अस्पतालमा भएको समयमा लड्ने खतरा रोकथाम गर्ने अनि कम गर्ने एउटा

पलंग अनि कोठामा सुरक्षा:



- छोडेर जान अघि कोक्रोको बार उच्चतम अवस्था सम्म उठाएर राखेको निश्चित गर्नुहोस।



- तपाईंको बच्चाको सहायता मान्ने घण्टी (कल बेल) उसको हातले भेटने स्थानमा राखिदिनुहोस अनि सहायता चाहिएको समयमा यसको प्रयोग गर्नु भन्नुहोस।



- तपाईंको बच्चालाई पलंगमा उभिनु नदिनुहोस।



- प्रयोजन परेमा सुरक्षा बनियान (सेफ्टी भेस्ट) व्यवहार गर्नुहोस।