

श्वासप्रश्वासमा समस्या हुने बच्चालाई सहयोग गर्ने कार्यहरू

1. श्वासप्रश्वासमा समस्या भएको सुनिश्चित गर्न कुनै पनि खोकेको वा सास फेरेको अवलोकन गर्नुहोस्।
2. खोक्र प्रोत्साहन गर्नुहोस्।
3. ढाडमा थपथपाउन र सबडायफ्रामेटिक पेटमा धक्काहरू दिनको लागि उहाँको अगाडि तपाईं उभिनहुनेछ भनी बच्चालाई भन्नुहोस्।
4. 5 पटक ढाडमा थपथपाउनुहोस्।
 - बच्चालाई एउटा पाखुराले होल्ड गरेर उहाँलाई अगाडि झुक्रको लागि सहायता गर्नुहोस्।
 - बच्चाको काँध ब्लेडहरू बीच तपाईंको विपरित हातको पछिल्लो भाग प्रयोग गरेर 5 पटक ढाडमा थपथपाउनुहोस्।



बाहिरी वस्तु बाहिर निकाल्न सकिँदैन भने, सबडायफ्रामेटिक पेटमा धक्काहरू दिनुहोस्।

टिप्पणी: वायु मार्ग खोल्नुहोस् र देखिएको कुनै बाहिरी वस्तुलाई हटाउनुहोस्। मुखमा नाङ्गो औंलाले सफा नगर्नुहोस् जसले बाहिरी वस्तुलाई वायु मार्ग भित्र थप पछाडि धकाल्न सक्छ।



5. सबडायफ्रामेटिक पेटमा धक्काहरू दिनुहोस् (हेइम्लिच म्यानुएभर)

- बसिरहनुभएको वा उभिरहनुभएको बच्चाको अगाडि उम्भेर यो म्यानुएभर गर्नुहोस्।
- बच्चाको पेटलाई घुमाउनको लागि तपाईंका पाखुराहरूको प्रयोग गर्नुहोस्।
- एउटा हातले मुठ्टी बनाउनुहोस् र नभेलको अलि माथि बच्चाको पेटको बिचमा बूढी औंलापट्टीको भागलाई राख्नुहोस्।
- तपाईंको मुठ्टीलाई बाँध्नुहोस् र बच्चाको पेटमा 5 पटक द्रुत रूपमा माथितर्फ दबाउनुहोस्।
- छिपोड वा रिब केजमा नदबाउने भनी सचेत रहनुहोस्।



बाहिरी वस्तु ननिकलेसम्म व्यक्तिगत धक्काहरू जारी राख्नुपर्छ। अधिकतम 5 पटक पेटमा धक्काहरू दिनुहोस्।

त्यहाँ कुनै अकस्मात सास फेर्ने छैन वा बच्चा अचेतन हुनुभयो भने, तुरुन्तै

एम्बुलेन्सलाई कल गर्नुहोस् र सास फेर्न उद्धार गर्ने प्रयास गर्नुहोस्। कार्डिओ-पलमोनरी उद्धार

(H.K. St. John एम्बुलेन्स, श्वास-प्रश्वास प्रणाली र निस्सासिनु)

स्वीकृति

बिरामी सशक्तिकरण कार्यक्रम
न्यू टेरिटरिज वेस्ट क्लस्टर

鳴謝
Acknowledgement

新界西醫院聯網
New Territories West Cluster
病人啟力基金
Patient Empowerment Programme

यदि यस उक्त गरिएको प्रतिनिधि र चाईनीज / अंग्रेजी प्रतिनिधिमा कुनै संदेह भएमा अथवा नसिनेको ठाँउ भेटिएमा कृपया चाईनीज / अंग्रेजी साई प्रसित ठान्नु होला। र तपाईंले चाईनीज / अंग्रेजी पत्राको माँग गरे हुन्छ।

In case of doubt or discrepancy between this translated version and the Chinese/English texts, the Chinese/English shall prevail. You may request a Chinese/English leaflet.

Date of Printing : Nov., 2019

अस्पताल

बालरोग तथा किशोर-किशोरीका लागि औषधिको विभाग,
Tuen Mun Hospital
Department of Paediatrics & Adolescent Medicine

शिशु तथा बच्चालाई श्वासप्रश्वासमा समस्या हुने

Infant and child choking



परिभाषा:

- वायु मार्ग वा घाँटीमा खाना वा अन्य बाहिरी वस्तु अङ्किएको अवधिमा श्वासप्रश्वासमा समस्या हुन्छ। वस्तुले फोक्सोमा हावा जानबाट रोक्छ। यसले सास फेर्न कठिनाई गराउँछ। श्वासप्रश्वासको समस्यालाई एक पटकमा नियन्त्रण गर्नुपर्छ।
- शिशुहरूलाई आफ्नो मुखमा साना वस्तुहरू हाल्न मनपर्छ, त्यसैले बुवाआमाहरूले घरेलु सुरक्षामा एकदमै ध्यान राख्नुपर्छ।

लक्ष्यहरू:

- वस्तुलाई बाहिर निकाल्नुहोस् र सम्भव भएसम्म छिटो पुनः सामान्य सास फेर्नुहोस्।
- एम्बुलेन्सलाई कल गर्नुहोस् र आवश्यक भएमा अस्पताल जानुहोस्।



लक्षणहरू:

शिशुलाई श्वासप्रश्वासमा समस्या हुने

- खोक्र, रून वा सास फेर्न नसक्ने।
- अनुहार फ्लशिड, क्रोनाइसिस र श्वासको कमी हुने।

बच्चालाई श्वासप्रश्वासमा समस्या हुने

- बच्चाले आफ्नो घाँटीलाई संकेत गर्न सक्नुहुन्छ वा घाँटीमा समाल सक्नुहुन्छ।
- खोक्र, सास फेर्न वा बोल्न नसक्ने।
- अनुहार फ्लशिड, क्रोनाइसिस र श्वासको कमी हुने।

श्वासप्रश्वासमा समस्या भएको बच्चालाई सहयोग गर्ने

कार्यहरू:

शिशुलाई गम्भीर श्वासप्रश्वासमा समस्या भएको अवधिमा, वायु मार्गलाई ब्लक गरेको वस्तुलाई हटाउनको लागि ढाडमा थपथपाउने र छातीमा दबाव दिने प्रयोग गर्नुहोस्।

श्वासप्रश्वासमा समस्या भएको शिशुलाई सहयोग गर्न यी चरणहरूको पालना गर्नुहोस्:

1. श्वासप्रश्वासमा समस्या छ भनी सुनिश्चित गर्न कुनै खोकेको वा रोएको अवलोकन गर्नुहोस्

2. 5 पटक ढाडमा थपथपाउनुहोस्

शिशुको बङ्गरालाई होल्ड गर्न हातको प्रयोग गर्नुहोस् र आफ्नो पाखुरामा उहाँको शरीरलाई राख्नुहोस्। उहाँको टाउको, घाँटी र ढाड होल्ड गर्न अर्को हातको प्रयोग गर्नुहोस्, त्यसपछि बच्चालाई तलतिर झुकाउनुहोस्। तपाईंको तिघ्रामा सुताएर आफ्नो पाखुरामा उहाँको टाउकोलाई उहाँको शरीरभन्दा तल राख्नुहोस्।

बच्चको काँध ब्लेडहरू बीच तपाईंको अर्को हातको पछिल्लो भाग प्रयोग गरेर 5 पटक ढाडमा थपथपाउनुहोस्।



5 पटक ढाडमा थपथपाइसकेपछि वस्तु बाहिर आउँदैन भने, छातीमा 5 पटक दबाव दिनुहोस्।

3. छातीमा 5 पटक दबाव दिनुहोस्

- शिशुको टाउको र ढाडलाई सहायता दिनुहोस्
- तपाईंको तिघ्रामा सुताएर आफ्नो पाखुरामा उहाँको शरीरभन्दा टाउको तल राखेर शिशुको अनुहार माथि फर्काउनुहोस्।
- माझी औला र साहिली औलाको प्रयोग गरेर छातीमा 5 पटक दबाव दिनुहोस्।
- आन्तरिक-स्तनीय लाइनको ठीक तल (छिपोइड वा रिब्स माथि होइन) छातिको हाडलाई दबाउनुहोस्



बाहिरी वस्तु बाहिर नलिकलेसम्म वा शिशुले पुनः सास फेर्न सक्षम नभएसम्म पुनः 5 पटक ढाडमा थपथपाउनुहोस् र छातीमा 5 पटक दबाव दिनुहोस्।



त्यहाँ कुनै अकस्मात सास फेर्ने छैन वा बच्चा अचेतन हुनुभयो भने, तुरुन्तै एम्बुलेन्सलाई कल गर्नुहोस् र सास फेर्न उद्धार गर्ने प्रयास गर्नुहोस्।

