

بچے کے چونگ بونے پر مدد کیائے عمل

1. چونگ کی تصدیق کرنے کیلئے کسی کھانسے یا رونے کا مشابدہ کریں۔
2. کھانس کرنے کی حوصلہ افزائی کریں۔
3. بچے کو بتائیں کہ آپ کمر پر تھپٹ لگانے اور حجاب حاجز کے نیچے پیٹ سے دھکیلنے کے لئے اس کے پیچے کی جانب کھڑے ہو جائیں گے۔
4. بار پیچے سے تھپٹ لگائیں۔
5. بچے کو اس کے اگے جھکنے، اسے ایک باتھ سے تھامنے میں مدد کریں۔
- بچے کے کندھوں کے ابھار کے درمیان اپنے اللٹے باتھ کے کناروں کو استعمال کرتے ہوئے 5 بار اللٹا تھپٹ لگائیں۔



اگر بیرونی شے کو بابر نکالا نہیں جا سکتا ہے، تو حجاب حاجز کے نیچے پیٹ سے دھکیلنے کے عمل کو انجام دیں۔

تبصرہ: بوانی نالی کھولیں اور مشابدہ کردہ بیرونی شے کو بتائیں۔
منہ میں انجانے انداز میں انگلیوں کو نہ گھسنیں جس سے وہ شے سانس کی نالی میں مزید اگئے جا کر پھنس سکتی ہے۔



5. حجاب حاجز کے نیچے پیٹ سے دھکیلنے کے عمل کو انجام دیں

(بیملج عمل کاری)

- اس عمل کاری کو بچے کے پیچے سے جو کھڑا یا بیٹھا بوا بوا، انجام دیں۔
- بچے کے پیٹ کے گرد دائرہ بنانے کے لئے اپنے ہاتھوں کو استعمال کریں۔
- ایک باتھ سے ایک مٹھی بنائیں، اور بچے کے پیٹ کے وسط کے سامنے انگوٹھے کے ساتھ رکھیں، ناف سے تھوڑا سا اوپر۔
- اپنی مٹھی کو ہلائیں اور بچے کے پیٹ سے اوپر کی جانب نیز رفتار کے ساتھ 5 بار دباتے جائیں۔
- کری ڈی یا پسلیوں کے پنجر پر دباؤ نہ ڈالیں۔



انفرادی اخراجی کوششیں اسی وقت تک جاری رہنی چاہئے جب تک کہ وہ شے بابر نہیں نکل جاتی ہے۔ پیٹ کے زیادہ سے زیادہ 5 دھکیلنے کے عمل انجام دیں

اگر کوئی بلا تحریک سانس لینے کا عمل نہیں ہے یا بچہ بے بوش ہے، تو ایمبولینس کو فوری طور پر فون کریں اور بچا کی سانس دلانے کی کوشش کریں۔

کارڈیو - پلمونری کی بحالی

(ایج کے سینٹ جان ایمبولینس، سوزش نظام اور دم گھٹنا)

تسليمات

مریض اختیار دبی پروگرام
تنے علاقے مغربی کلستر

贊語

Acknowledgement
New Territories West Cluster
病人能力基金
Patient Empowerment Programme

اگر انگلش اور اردو ورثن میں کوئی تضاد پایا گیا تو انگلش ورثن کو بے مانا خاتے گا۔

Should there be any inconsistency between the English and Urdu version, the English version shall prevail.

ٹوئن من ہسپتال



پیڈیاٹرکس اور بالغ ادویات کا شعبہ،

Tuen Mun Hospital

Department of Paediatrics & Adolescent Medicine

بچہ اور بچے کا دم گھٹنا

Infant and child choking



3. 5 بار سینے کو دھکیلنا انجام دن

• بچے کے سر اور کمر کی معاونت کریں۔

• اپنی ران پر موجود اپنے بازو پر سر کو جسم کی

• نسبت نیچا رکھتے ہوئے، شیر خوار کے منہ کو اوپر اٹھائیں۔

• درمیانی انگلی اور تیسرا انگلی استعمال کرتے ہوئے 5 بار سینے پر زور دیں۔

• انثرمیمیری لائن کے نیچے صرف جوف سینہ (نہ کے سینے کی کری بڈی یا پسلیوں پر) دباؤ ڈالیں




جب تک خارجی شے قوت سے بابر نہیں نکل جاتی ہے یا جب تک شیرخوار دوبارہ سانس لے لینے کے قابل نہیں ہو جاتا ہے، 5 الٹے کمر پر تھیڈ لگائیں اور 5 بار بچے کے سینے پر دباؤ ڈالنے کو دوبارے رہیں۔

اگر کوئی بلا تحریک سانس لینے کا عمل نہیں ہے یا بچے بے بوش ہے، تو ایمبولینس کو فوری طور پر فون کریں اور بچا کی سانس دلانے کی کوشش کریں۔



اہداف:

- شے کو فوری بابر نکالیں اور حتیٰ جلدی ممکن ہو عمومی انداز میں سانس لینے کی شروعات کریں۔
- ضرورت کے مطابق ایمبولینس کو فون کریں اور ہسپتال جائیں۔



علامات:

شیرخوار کی چونگ

- کھانس، رو یا سانس نہیں لے سکتا۔
- چہرہ سرخ یا نیلا پڑ جاتا ہے، اور سانس اکھڑتا۔

بچہ کی چونگ

- بچہ اپنے گلے کی جانب اشارہ کو سکتا یا گردن پکڑ سکتا ہے۔
- کھانس نہیں سکتا، سانس لے یا بول نہیں سکتا۔
- چہرہ سرخ یا نیلا پڑ جاتا ہے، اور سانس اکھڑتا۔

شیرخوار کے چونگ کی صورت میں عمل:

جب ایک بچے کو شدید چونگ بو جاتی ہے، تو شے کے ہوا کی نالی کو بند کر دینے سے ہٹانے کیلئے اس کی کمر پر تھیڈ لگائیں اور سینے کو دھکیلیں۔

گلے میں پہنہ لگے بچے کی مدد کیائے ان اقدامات پر عمل کریں:

1. چونگ کی تصدیق کرنے کیلئے کسی کھانسے یا رونے کا مشاہدہ کریں۔

2. 5 الٹے تھیڈ کا عمل انجام دیں

- بچے کے جبڑے کو پکڑنے اور اس کے جسم کو اپنے بازوں پر رکھنے کے لئے ایک باتھ استعمال کریں۔ اس کے سر، گردن اور کمر کو پکڑنے کے لئے دوسرا باتھ استعمال کریں، پھر بچے کو نیچے کی طرف جھکائیں۔
- اپنے بازو کو اپنی ران پر رکھتے ہوئے اس کے سر کو اس کے جسم کی نسبت نیچا رکھیں۔

- بچے کے کندھوں کے ابھار کے درمیان اپنے باتھ کے کناروں کو استعمال کرتے ہوئے 5 بار الٹا تھیڈ لگانے کا عمل کریں۔



اگر شے پچھلے 5 تھیڈوں کے بعد بھی بابر نہیں نکلتی ہے، تو 5 بار سینے کو دھکیلے کو انجام دیں۔

