

1. 我抽不到胃內容物來測試酸鹼度,怎麼辦?

- · 可嘗試改變身體姿勢,建議向左轉,等數分鐘 後,再嘗試抽取胃內容物;
- · 嘗試嗅一些會刺激胃液分泌的食物,例如橙、 檸檬、醋等,之後再嘗試抽取胃內容物。

2. 我抽出的胃內容物太多,怎麼辦?

胃內容物	腸胃不適 / 腹脹情況	處理方法
<100 毫升	無	依時餵飼
<100 毫升	有	將餵飼時間 延遲一小時
100-150 毫升	無	將餵飼份量減半, 並觀察下次餵飼前 胃內容物的多少
100-150 毫升	有	暫停餵飼一次,一 小時後再抽取內容 物,若仍超過 100 毫升,請於辦公時 間內聯絡負責你個 案的社康護士。

· 如抽出的胃內容物呈啡色 / 有異常,請即停止餵 飼,並觀察和紀錄抽出的胃內容物的色、質、 量,及盡快**求診就醫**。

3. 已開封的配方奶要如何處理?

開封後註明開啟日期及時間,之後封蓋及放回雪櫃,可保存24小時。如超過24小時,要立即棄置。

4. 鼻胃管滑出怎麼辦?

切勿自行插回鼻胃管,應盡快前往急症室求診。





鳴謝:新界西醫院聯網病人啟力基金

Version 01/2017

簡介

有部份上消化道疾病的病人會有 吞嚥困難而導致營養不良。為了令病 人的身體達到理想的營養水平及促 進術後康復進展,醫生會考慮為病人 置入鼻胃管,加強營養。另外在手術 後,為促進傷口的癒合,亦有機會使 用鼻胃管作餵飼之用。

因此,當病人或家人學懂如何使 用鼻胃管餵飼之後,病人便無需因此 而留院,可以自行在家休養。



體飼所需的物品











- 膠腰兜 或 膠碗
- · 所需份量的配方奶 (按營養師指引)

注意:溫度要適中,切勿過冷/過熱, 切勿用微波爐翻熱,如有需要可 用熱水浸暖。

· 所需份量的暖水 (按營養師指引)

餵飼程序

