




腹腔鏡檢查及絕育手術

甚麼是腹腔鏡檢查？

在全身麻醉下施行。在肚臍以下切開一小孔，注入二氧化碳，然後放入腹腔鏡作腹腔內之窺視，觀察各器官之狀況。如有需要，更會在下腹切開另一小孔，以便放入其他儀器來協助腹腔鏡檢查。

若病人是不育，手術過程中亦會把染料注射入子宮內來確定輸卵管暢通與否。手術完成，醫生放出二氧化碳後會把切口縫合。

整個手術需時約 **20 分鐘**。



甚麼是經腹腔鏡絕育手術？

手術大致如腹腔鏡檢查。不同之處是絕育手術是在腹腔鏡的觀察下，在每邊輸卵管上放上一個**以矽塑料及鈦造成的夾子**。整個手術需時約 **25 分鐘**。

偶然，如因盆腔內有太多黏連，以致手術無法施行，醫生則會施行雙側輸卵管結紮術。

術前須知

1. 手術當天的零時開始不可進食和喝水。
2. 請帶備衛生巾。
3. 手術前要有適當的避孕措施，以確保手術是在沒有懷孕的情況下施行。

術後須知

1. 病人應臥床休息。
2. 手術後會有不同程度的痛楚，**可服用止痛藥**。
3. 術後 2 至 3 天可拆線。

出院

1. 醫生會給予適量的止痛藥。
2. 術後休假一般為 7 天。
3. 覆診日期是在手術後 **12-16 星期**。

請注意：絕育手術雖然在正確程序下完成，亦會有手術失效之可能而再度懷孕。在一千宗絕育手術中，大約有 1 至 4 宗出現此種情況。**若萬一再度懷孕的話，宫外孕的可能性會頗高，當儘快找專科醫生檢查。**

資料由本院婦產科提供
視聽及美術設計組製作

腹腔鏡檢查及絕育手術

Laparoscopy and Female Sterilization

